

Protocole d'Intervention d'URGENCE

Réaction Allergique GRAVE

Réaction **GRAVE**



Ce qu'il faut faire

INJECTER IMMÉDIATEMENT L'ADRÉNALINE

Si un ou plusieurs des symptômes ci-dessous :


- Ma voix change,
- Je respire mal et/ou je siffle,
- Je tousse,
- J'ai très mal au ventre,
- Je vomis,
- Je me gratte les mains et/ou les pieds et/ou la tête,
- Je me sens mal ou bizarre,
- Je fais un malaise.



« CELA PEUT ETRE ENCORE **PLUS GRAVE**
SI **PLUSIEURS SYMPTÔMES S'ASSOCIENT**
ENSEMBLE »

① **INJECTER** dans l'ordre suivant :

Allonger (dos ou coté)



+

Enlever le bouchon noir puis le caoutchouc gris (protection aiguille)



Retirer le bouchon gris du bouchon rouge




+

Enfoncer fermement sur le coté extérieur de la cuisse même par-dessus le vêtement fin



Maintenir enfoncé pendant 10 sec + **Retirer** puis **Masser** la zone injectée



② **APPELER** le SAMU en composant le



③ **PAS D'AMÉLIORATION** après quelques minutes ?

INJECTER un 2^{ème} stylo, de préférence dans l'autre cuisse.