

Protocole d'Intervention d'URGENCE

Réaction Allergique GRAVE

Réaction GRAVE



Ce qu'il faut faire

INJECTER IMMÉDIATEMENT L'ADRÉNALINE


Si au moins un des symptômes ci-dessous :

- Ma **voix change**,
- Je **respire mal** et/ou je siffle,
- Je **tousse**,
- J'ai **très mal au ventre**,
- Je **vomis**,
- Je **me gratte** les mains et/ou les pieds et/ou la tête,
- Je **me sens mal** ou bizarre,
- Je fais un **malaise** et/ je **perds connaissance**.




① INJECTER dans l'ordre suivant :


Allonger (dos ou coté) + Enlever le stylo du tube transparent



Retirer le capuchon bleu + Enfoncer le fermement sur le coté extérieur de la cuisse même par-dessus le vêtement fin



Maintenez le enfoncé pendant 10 sec + Retirer puis Masser la zone injectée



② APPELER le SAMU en composant le **15**

SI DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE ?
Voir le PIU
réaction légère.

③ **PAS D'AMÉLIORATION** après quelques minutes ?

INJECTER le 2^{ème} stylo, de préférence dans l'autre cuisse.

« CELA PEUT ETRE ENCORE PLUS GRAVE
SI PLUSIEURS SYMPTÔMES S'ASSOCIENT
ENSEMBLE »