

Protocole d'Intervention d'URGENCE

Réaction Allergique GRAVE

Réaction GRAVE



Ce qu'il faut faire

INJECTER IMMÉDIATEMENT L'ADRÉNALINE

Si un ou plusieurs des symptômes ci-dessous :


- Ma voix change,
- Je respire mal et/ou je siffle,
- Je tousse,
- J'ai très mal au ventre,
- Je vomis,
- Je me gratte les mains et/ou les pieds et/ou la tête,
- Je me sens mal ou bizarre,
- Je fais un malaise.




« CELA PEUT ETRE ENCORE PLUS GRAVE
SI PLUSIEURS SYMPTÔMES S'ASSOCIENT
ENSEMBLE »

1 INJECTER dans l'ordre suivant :


Allonger (dos ou coté) + **Enlever** le stylo du tube transparent



Retirer le capuchon bleu + **Enfoncer** fermement sur le coté extérieur de la cuisse même par-dessus le vêtement fin



Maintenir enfoncé pendant 10 sec + **Retirer** puis **Masser** la zone injectée



2 APPELER le SAMU en composant le 15 et prévenir les parents.



SI DIFFICULTÉ
RESPIRATOIRE ?
Voir le PIU
réaction légère.

3 PAS D'AMÉLIORATION après quelques minutes ?

INJECTER un 2^{ème} stylo, de préférence dans l'autre cuisse.



Association IsAllergies 51 - Association d'ENFANTS Allergiques - 4 allée Georges Ploix - 51100 BAZANCOURT - Siret : 851 811 430 00012

✉ association.isallergies51@gmail.com - www.association-isallergies51.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Date de mise à jour : 25/04/2021