

# Protocole d'Intervention d'URGENCE

## Réaction Allergique **LÉGÈRE**

Réaction **LÉGÈRE**



**Ce qu'il faut faire**

Si un ou plusieurs des symptômes ci-dessous :

- Ma bouche et/ou mes yeux me pique(nt) ou me gratte(nt),
- Mon nez coule,
- Mes lèvres gonflent,
- J'ai des boutons ou des plaques rouges qui me grattent,
- J'ai un peu mal au ventre et j'ai envie de vomir.

« **MAIS JE PARLE ET JE RESPIRE BIEN** »

**1 ADMINISTRER** les médicaments suivants :

➤ **Antihistaminique**

Consulter la posologie sur l'ordonnance

A savoir ☞ 1 mesure = **5ml en pipette**



➤ **Corticoïde**

Consulter la posologie sur l'ordonnance

A savoir ☞ 300 gouttes = **1 cuillère ½ à café**

OU

**1 comprimé** oro-dispersible  
(fond sur la langue)



**DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE ?**

➤ **Bronchodilatateur + Chambre d'inhalation**

(selon l'âge et les capacités de l'ENFANT)

**2 à 10 bouffées/prise** selon la gêne respiratoire



A répéter toutes les 2 à 5 minutes si nécessaire.

**2 PRÉVENIR** les parents.

Si besoin d'un avis médical, appeler le SAMU

